

## SERVIZIO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

### REAZIONE AVVERSA AL MEZZO DI CONTRASTO

Gentile signore, gentile signora,

Qualora dall'anamnesi risultino precedenti reazioni avverse dopo l'utilizzo di mezzi di contrasto, o in caso di diatesi allergica in paziente con manifestazione di asma, laringospasmo o orticaria, il suo MEDICO CURANTE deve preventivamente consultarsi con il MEDICO RADIOLOGO per valutare se esistano metodiche diagnostiche alternative e meno rischiose.

Successivamente, nel caso si decida di procedere all'indagine, dovrà essere attuata e attestata la seguente profilassi:

A DOMICILIO O IN REPARTO :

**PREDNISONE (DELTACORTENE FORTE ) 50mg per os (2 cp) ogni 6 ORE INIZIANDO 18 ORE PRIMA DELL'ESAME ASSOCIATO A PROTETTORE GASTRICO.**

- somministrazione**      **prima dose alle ore** .....
- somministrazione**      **seconda dose alle ore** .....
- somministrazione**      **terza dose alle ore** .....

II MEDICO CURANTE

.....

IL SOTTOSCRITTO.....CONFERMA  
DI AVER EFFETTUATO LA SUDETTA TERAPIA    SECONDO    LO SCHEMA RIPORTATO.

FIRMA DEL PAZIENTE

.....

### **IN RADIOLOGIA (PRESENTARSI IN ANTICIPO DI 45 MINUTI)**

IL SOTTOSCRITTO MEDICO RADIOLOGO PRESO ATTO DELL' EFFETTUAZIONE DELLA TERAPIA PREVENTIVA SOPRA RIPORTATA, PROCEDE ALL'INIEZIONE DI " CLORFENIRAMINA ( TRIMETON) 10 MG , 30 MINUTI PRIMA DELL'ESAME , SOMMINISTRATO I.M.

FIRMA DEL MEDICO RADIOLOGO

.....